

Órgano/ Tejido	Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Riñón 	• Edad menor de 60 años. • Antecedentes de drogas nefrotóxicas. • Estabilidad hemodinámica de las últimas 12 horas y su relación con medicamentos inotrópicos utilizados. • Antecedente de traumatismo reciente a nivel abdominal o lumbar. • TA Sistólica promedio mayor de 100 mmHg . • TA diastólica promedio mayor de 60 mmHg • TAM idealmente de 100 mmHg . • Gasto urinario mayor de 2 ml/kg/hr en adultos y mayor de 3 ml/kg/hora en niños. • Creatinina máximo de 2.5 mg /dl cuando sea de origen pre-renal.	<i>Absolutos</i> • VIH • Sepsis • Fracaso multiorgánico • Enfermedad tumoral maligna con capacidad metastásica. • Creutzfeldt-Jakob, Kuru, Gersmann-Straussier-Scheinker, Insomnio familiar fatal. • Pacientes tratados con hormonas derivadas de la pituitaria de cadáver. • Insuficiencia renal crónica <i>Relativos</i> • Edad • Hipertensión arterial • Diabetes • Fracaso renal agudo. • Isquemia caliente prolongada. • Glomerulonefritis • Serología positiva para Hep B y Hep C.