

Órgano/ Tejido

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Hígado



- Menos de diez días hospitalizado.
- Sin antecedentes de prácticas de alto riesgo.
- Sin trauma cerrado de abdomen que involucre trauma hepático.
- Sin aminos o dosis bajas de aminos (Dopamina menor a 10 ug/kg/min).
- No eventos de paro o hipotensión prolongados (menor a 90/60 mmHg por más de 1 hora).
- Mantener presión media en 60 mmHg.
- Edad entre 18 y 55 años.
- Sin comorbilidades ni antecedentes de abuso de alcohol u otras sustancias.
- IMC menor a 30.
- PVC menor a 12 mmHg.
- Esteatosis hepática por biopsia menos del 30%.
- Laboratorios:
 - ✓ Na menos a 160 mEq/dl
 - ✓ ALT o AST menos a 100
 - ✓ INR normal
 - ✓ Bilirrubina normal total
 - ✓ GGT normal
 - ✓ Hb mayor a 10 mg/dl

Absolutos

- Alcoholismo o adicción a drogas activos
- SIDA
- Insuficiencia o disfunción grave de otro parénquima que no sea tributario de tratamiento curativo
- Infección extrahepática no controlada.
- Tumor maligno extrahepático, primario o secundario.

Relativos

- Trombosis venosa portal
- Sepsis biliar o intrahepática
- Ausencia de apoyo social
- Enfermedad psiquiátrica
- HIV positivo
- Edad mayor de 65 años
- Obesidad IMC ≥ 40